

## Information

### vedrørende laserbehandling af regnbuehinden.

Nogle mennesker, især dem der er langsynede, har et ret lille øje. Med alderen kan dette føre til at pladsforholdene i øjet bliver for trange. Herved kan der være risiko for, at der kan komme akut forhøjet øjentryk. Hvis øjentrykket stiger meget, kan det i løbet af ganske kort tid ødelægge synet.

Har man denne tendens, kan man forebygge, at det udvikler sig til forhøjet tryk, ved at lave et lille hul i regnbuehinden med laser.

Selve behandlingen mærkes som et lille stik, men der er ikke noget at mærke, når behandlingen er overstået.

Komplikationer ved behandlingen er meget sjældne, men kan forekomme. Man kan i forbindelse med behandlingen komme til at ramme et skjult blodkar, som så vil bløde kortvarigt og synet vil så være sløret i en kort periode. Undlad derfor selv at køre bil til undersøgelsen.

Der er også en lille risiko for, at man kan udløse regnbuehindebetændelse. For at forebygge dette skal man derfor dryppe med binyrebark hormon i nogen dage efter behandlingen. Recept herpå laves ved forundersøgelsen.

Resultatet af behandlingen kontrolleres efterfølgende hos øjenlægen.

Hvis der kommer gener – skal man henvende sig.

Denne behandling forebygger IKKE mod almindelig/kronisk grøn stær.

Undlad selv at køre bil til undersøgelsen

Øjenlæge Neel Gerner August 2015